

GERYBINIŲ ODOS DARINIŲ IR PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS CHIRURGINIU CO2 LAZERIU

Papildoma informacija teikiama ir paslaugai registruojama darbo dienomis telefonu
0 449 74340



VšĮ Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centre, gerybiniai odos dariniai ir kiti pažeidimai šalinami chirurginiu CO2 lazeriu GYNELASE, sujungiančiu aukštas technologijas ir maksimalią naudą, sukuriančią daugiadisciplininę ir universalią sistemą, siūlančią maksimalų chirurginio gydymo, ginekologinio ir dermatologinio gydymo tikslumą.

Kokius odos darinius saugu šalinti CO2 lazeriu?

Dažniausiai CO2 lazeriu šalinami gerybiniai odos dariniai. **Prieš procedūrą dariniai turi būti įvertinti gydytojo dermatovenerologo dermatoskopu**, siekiant paneigti darinio piktybiškumą. Kiekvienas atvejis yra individualus, reikalaujantis detalaus ištyrimo ir aptarimo.

Kokios kontraindikacijos CO2 lazerio procedūrai?

- Izotretinoino naudojimas pastaruosius 6 mėnesius
- Bakterinė, virusinė ar grybelinė odos infekcija lazerio gydymo vietoje
- Polinkis keloidų arba hipertrofinių randų susiformavimui
- Nuolatinis ultravioletinių spindulių poveikis
- Nėštumo/žindymo laikotarpis
- Kai pacientas serga komplikotos eigos cukriniu diabetu, kraujo krešumo sutrikimus sąlygojančiomis ligomis, vartoja prednizoloną, arba kitą sisteminio poveikio imunosupresinį vaistą, vartoja fotosensibilizuojančius vaistus (pvz., tetraciklinų ir fluorochinolonų grupių antibiotikus);
- Taip pat lazerio procedūros neatliekamos jaunesniems nei 16 m. asmenims, esant apsunkintam kontaktui su pacientu arba nerealiems lūkesčiams dėl pageidaujamų rezultatų

Kada tinkamiausias laikas darinių šalinimui lazeriu?

Jei dariniai saulei atvirose vietose (veidas, kaklas, dekoltė, plaštakos) – jų šalinimui tinkamiausias šaltasis sezonas, kai saulė nebe tokia aktyvi. Lazeriu pašalinus darinį, toje vietoje susidaro šašelis, kuriam gyjant, gavus saulės spindulių, gali likti pigmentacija. Jei darinys šalinamas drabužiais nuo saulės uždengtose srityse, laikas šalinimui nėra svarbus.

Kaip pasiruošti procedūrai?

Šalinama sritis turi būti švari, be kosmetikos. Pirmomis dienomis po darinių šalinimo neplanuokite apsilankymų baseinuose, pirtyse. Neplanuokite šalinimo prieš keliones į šiltas šalis, nes mėnesį laiko turėsite vengti tiesioginių saulės spindulių, naudoti apsauginius kremus nuo saulės.

Kaip vyksta procedūra?

Prieš procedūrą yra atliekamas vietinis nuskausminimas injekciniu lidokaino tirpalu. Esant nedideliam ir paviršiniam dariniui (pvz., papilomai) nuskausminimas gali būti netaikomas, šiuo atveju būtų jaučiamas nežymus diskomfortas procedūros vietoje. Darinio šalinimo trukmė priklauso nuo jo dydžio ir lokalizacijos, įprastai vienas darinys (apgamai, seborėjinė keratozė) pašalinamas per

10 – 20 minučių. Po šalinimo procedūros sritis sutepama antibiotiko ar pantenolio ir chlorheksidino kremu.

Kaip prižiūrėti procedūros vietą?

Rekomenduojama pirmą savaitę po procedūros žaizdelę dezinfekuoti ir tepti antibakteriniu tepalu. Mėnesį po šalinimo būtina naudoti apsauginį kremą nuo saulės su SPF 50+. Pastebėjus atsirandant šalutiniams gydymo lazeriu reiškiniams, tikslinga kreiptis į gydytoją dermatovenerologą jų korekcijai.

Kokios galimos darinių šalinimo komplikacijos?

Iš karto po procedūros pašalinto darinio srityje susidaro nedidelė žaizdelė ar šašelis, gali būti jaučiamas lokalus skausmingumas, paraudimas, patinimas, kuris praeina per kelias valandas – dienas. Žaizdelės visiškai sugyja per 4 savaites. Retais atvejais, sugijus žaizdai, gali atsirasti odos hiperpigmentacija ir hipopigmentacija (~2 proc.), todėl būtina po procedūros naudoti apsauginius kremus nuo ultravioletinių saulės spindulių. Pašalinto darinio srityje gali likti randas. Labai retais atvejais, esant polinkiui į hipertrofinių randų susiformavimą, gali susidaryti keloidai arba hipertrofiniai randai (1,5-2 proc.). Priklausomai nuo odos darinio gylio, retais atvejais gali susiformuoti odos įdubimas (~1,5 proc.) arba darinio ataugimas (~2 proc.).

Kokie sveikatos priežiūros specialistai teiks šias paslaugas?

Gerybinių odos darinių ir kitų pažeidimų šalinimo chirurginiu CO2 lazeriu paslaugą teiks šių specializacijų gydytojai: dermatovenerologai, chirurgai ir kt..

SVARBU ŽINOTI

Suaugusiems asmenims gerybinių odos darinių, esančių veido ir kaklo srityse, šalinimo paslauga chirurginiu CO2 lazeriu finansuojama iš PSDF (Privalomojo sveikatos draudimo fondo) lėšų, todėl Jums ji nekainuos. Vaikams iki 18 metų gerybinių odos darinių šalinimas finansuojamas iš PSDF nepriklausomai nuo kūno vietos, tačiau mūsų įstaigoje, pacientams jaunesniems nei 16 m. ir be jų tėvų, ar globėjų sutikimo, gerybinių odos darinių šalinimas chirurginiu CO2 lazeriu neatliekamas.

Tam, kad lazerio paslauga būtų nemokama, būtinai turi būti atliktas ir dokumentuotas darinio įvertinimas ir tinkamumas procedūrai NE TĄ PAČIĄ DIENĄ. Jei, atvykus šalinimui, dermatovenerologo konsultacija anksčiau nebuvo atlikta, kainuos tiek procedūra, tiek darinio įvertinimas dermatoskopu.

PROCEDŪROS KAINOS

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-83, gerybinių odos darinių ir pažeidimų šalinimo chirurginiu CO2 lazeriu procedūros yra mokamos, išskyrus Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktuose reglamentuotais atvejais (žiūrėti skyrių Svarbu žinoti).

1.	Gerybinių odos darinių ir pažeidimų šalinimas CO2 lazeriu įvairiose kūno vietose	Kaina eurais
1.1	Rando šalinimas 1cm ²	20,00
1.2	Karpos šalinimas (1 vnt. kaina)	7,00
1.3	Papilomų šalinimas genitalijų srityje (1 vnt. kaina)	15,00

1.4	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, 1 vnt. kaina	10,00
1.5	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, iki 5 darinių	20,00
1.6	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, 6-10 darinių	30,00
1.7	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, daugiau nei 10 darinių	40,00
1.8	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, daugiau nei 20 darinių	50,0
1.9	Papilomos, Hemangiomos 1-5 mm diametro šalinimas lazeriu, daugiau nei 30 darinių	60,00
1.10	Hemangiomos 5-8 mm diametro šalinimas lazeriu, 1 vnt. kaina	15,00
1.11	Hemangiomos >8 mm diametro šalinimas lazeriu, 1 vnt. kaina	20,00
1.12	Keratomos, papilomos, hemangiomos iki 1 cm pašalinimas lazeriu	10,00
1.13	Keratomos pašalinimas lazeriu nuo 1 cm	20,00
1.14	Keratomos, didesnės nei 2 cm pašalinimas lazeriu	30,00
1.15	Keratomos, papilomos, hemangiomų pašalinimas lazeriu, kai pašalinama 3-10 darinių	40,00
1.16	Keratomos, papilomos, hemangiomų pašalinimas lazeriu, kai pašalinama daugiau nei 10 darinių	50,00
1.17	Keratomos, papilomos, hemangiomų pašalinimas lazeriu, kai pašalinama daugiau nei 20 darinių	60,00
1.18	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, 1 vnt. kaina	10,00
1.19	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, iki 5 darinių	20,00
1.20	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, kai šalinama 6-10 darinių	30,00
1.21	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, kai šalinama daugiau nei 10 darinių	40,00
1.22	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, kai šalinama daugiau nei 20 darinių	50,00
1.23	Smulkių keratomų (1-5 mm) šalinimas lazeriu, kai šalinama daugiau nei 30 darinių	60,00
1.24	Apgamo iki 4 mm diametro šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu	30,00
1.25	Apgamo, didesnio nei 5 mm diametro, šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu	40,00
1.26	Apgamo, didesnio nei 10 mm diametro, šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu	50,00
1.27	Apgamo iki 4 mm diametro šalinimas lazeriu, su jau turimu darinio įvertinimu dermatoskopu	20,00
1.28	Apgamo, didesnio nei 5 mm diametro, šalinimas lazeriu, su jau turimu darinio įvertinimu dermatoskopu	30,00
1.29	Apgamo, didesnio nei 10 mm diametro, šalinimas lazeriu, su jau turimu darinio įvertinimu dermatoskopu	40,00